Muestra	Tipo de roca	87Rb/86Sr	87Sr/86Sr	1 sd	2 SE(M)	(87Sr/86Sr)i	147Sm/144Nd	143Nd/144Nd	1 sd	2 SE(M)	eNd	1sd	(143Nd/144Nd)i	(eNd)i	T-NdDM (Ga)	Edad de la muestra (Ma)	Rb (ppm)	Sr (ppm)	Sm (ppm)	Nd (ppm)
JLT-8A	microgabro	0.182	0.703694	38	11	0.703399	0.156	0.512903	16	4	5.17	0.31	0.512787	5.77	0.497	114	21.10	334.99	6.37	24.74
JLT-12	microgabro	0.103	0.703620	36	9	0.703453	0.147	0.512881	16	4	4.74	0.31	0.512772	5.47	0.480	114	17.63	495.25	3.00	12.38
JLT-13C	dique basáltico	0.048	0.703347	35	9	0.703299	0.171	0.512909	20	6	5.29	0.39	0.512830	5.51	0.665	70	5.85	353.15	5.62	19.81
JLT-23	cuarzo-monzodiorita	0.362	0.704149	38	10	0.703789	0.119	0.512774	20	5	2.65	0.39	0.512720	3.35	0.511	70	86.97	694.34	4.87	24.80
JLT-30-2	microgabro	0.163	0.703758	40	11	0.703493	0.153	0.512903	15	4	5.17	0.29	0.512789	5.81	0.475	114	23.40	414.52	8.28	32.72
JLT-32	microgabro	0.144	0.703837	38	10	0.703603	0.173	0.512924	19	5	5.58	0.37	0.512795	5.93	0.631	114	22.13	443.95	3.19	11.16
JLT-41	microgabro	0.404	0.704704	36	10	0.704130	0.163	0.512941	20	5	5.91	0.39	0.512834	6.34	0.456	100	45.77	327.91	3.50	12.95
JLT-45	microgabro	0.038	0.703497	35	10	0.703435	0.169	0.512984	17	5	6.75	0.33	0.512858	7.15	0.366	114	5.06	380.48	6.22	22.24
MZ-3	microgabro	0.005	0.703498	30	8	0.703493	0.154	0.512911	23	8	5.33	0.45	0.512840	5.70	0.465	70	2.34	1446.50	1.14	4.47
MZ-4	gabro	0.042	0.703536	37	10	0.703495	0.144	0.512939	16	4	5.87	0.31	0.512873	6.34	0.335	70	13.13	910.58	9.64	40.37
MS-25	gabro	0.223	0.703515	35	9	0.703154	0.185	0.512988	29	7	6.83	0.58	0.512850	7.00	0.558	114	25.00	318.00	2.50	8.20
Aq-1	gabro	0.054	0.703780	35	9	0.703736	0.162	0.512912	17	5	5.34	0.34	0.512852	5.60	0.532	57	11.77	628.40	2.02	7.54
ATG-1	meta-arenisca	43.30	0.751693	34	9	0.679078	0.187	0.512721	22	6	1.62	0.43	0.512576	1.76	2.202	118	232.92	15.63	1.81	5.84
D5-2Ext	basalto (P. Rivera)	0.093	0.702506	39	10	0.702504	0.208	0.513251	18	5	11.96	0.35	0.513249	11.96	-	1.4	5.66	175.50	8.05	23.40
D5-2Int	basalto (P.Rivera)	0.314	0.702526	41	11	0.702520	0.209	0.513239	19	5	11.72	0.37	0.513237	11.72	-	1.4	16.01	147.65	6.82	19.77

Tabla 7. Relaciones isotópicas de $^{87}Rb/^{86}Sr$, $^{87}Sr/^{86}Sr$, $^{147}Sm/^{144}Nd$, $^{143}Nd/^{144}Nd$, εNd (ver sección 3.6.2) y sus relaciones iniciales correspondientes que se identifican con el sufijo i. También se presentan las edades modelo (T_{DM}) y las concentraciones de Rb, Sr, Sm, y Nd en ppm calculadas por dilución isotópica, excepto la Aq-1, ATG-1, D5-2ext y la D5-2int, obtenidas por ICP-MS. 1sd = una desviación estándar. 2 SE(M) = 2sd/ raíz de n.